

Những Điều Đàn Ông Đồng Tính Và Song Tính Cần Biết Về Bệnh Đậu Mùa Khỉ

MONKEYPOX



Các trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện ở những người đàn ông đồng tính và song tính nhưng **không chỉ duy nhất** ở nhóm người này

Bệnh đậu mùa khỉ là gì

Đậu mùa khỉ là bệnh do vi-rút gây ra, lây truyền qua tiếp xúc gần trực tiếp, như hôn, quan hệ tình dục và các tiếp xúc da trực tiếp khác. Tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát hiện tại được ước tính là rất thấp.

Các triệu chứng là gì?

Triệu chứng điển hình



PHÁT BAN DA, NỔI MỤN NƯỚC TRÊN DA HOẶC PHÒNG RỘP DA

Những nốt này có thể xuất hiện ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Chúng có thể trông giống với giang mai, mụn rộp (herpes) hoặc phát ban da thông thường khác.

Các triệu chứng khác



Sốt và đau đầu



Đau cơ



Sưng hạch bạch huyết

Thời gian ủ bệnh từ 5-21 ngày

Những điều quý vị có thể làm



Cập nhật thông tin

Hãy giữ bình tĩnh. Đây là một tình huống liên tục thay đổi. Truy cập trang web của CDC để biết hướng dẫn cập nhật.



Liên hệ bác sĩ

Nếu quý vị có các triệu chứng, hãy gọi (không trực tiếp đến văn phòng thăm khám) cho bác sĩ của mình và hỏi về việc xét nghiệm.



Cách ly bản thân

Nếu quý vị có các triệu chứng, hãy ở nhà, đeo khẩu trang và che các vết tổn thương trên da để bảo vệ người khác.

Cập nhật: Tháng 6 năm 2022

**NGỪNG
KỶ THỊ**

Bất cứ ai cũng có thể bị Bệnh đậu mùa khỉ

Đổ lỗi cho người đồng tính nam, song tính và những người đàn ông khác có quan hệ tình dục đồng giới có thể gây hại cho các nỗ lực của cơ quan y tế công cộng và khiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bỏ qua bệnh đậu mùa khỉ ở các cộng đồng khác.

Xem các bản cập nhật mới nhất và tài liệu có thể tải xuống tại:
Gay Sexuality & Social Policy Initiative @ UCLA Luskin
gaysexresearch.com

